INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Strepsils Cool, sugetabletter
2,4-diklorbenzylalkohol 1,2 mg/amylmetakresol 0,6 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
* Du kan få Strepsils Cool uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Strepsils.
* Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
* Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
* Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
* Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Cool
3. Sådan skal du bruge Strepsils Cool
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Strepsils Cool sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende virkning. Strepsils Cool anvendes mod.øm og irriteret hals.

Lægen kan have givet dig Strepsils Cool for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE STREPSILS COOL
Brug ikke Strepsils Cool
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for diklorbenzylalkohol og/eller amylmetakresol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Hver ekstra forsigtig med at tage Strepsils Cool
- Hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.
- Hvis du er diabetiker, da Strepsils Cool indeholder 1.0 g glucose og 1.5 g saccharose pr. sugetablet.

Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet
Erfaringsgrundlaget fro anvendelse af Strepsils Cool til gravide er ringe.

Amning
Erfaringsgrundlaget for anvendelse af Strepsils Cool til ammende er ringe.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Strepsils Cool påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Strepsils Cool
Strepsils Cool indeholder glucose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Strepsils Cool kan være skadelig for tænderne ved længere tids brug.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE STREPSILS COOL

Hvis din læge har ordineret Strepsils Cool til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er
Voksne
1 sugetablet hver 2.-3. time, dog højst 12 sugetabletter i døgnet.

Børn
Strepsils Cool bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning

Ældre
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre.

Hvis du har brugt for mange Strepsils Cool
Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Strepsils Cool end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med.

Hvis du har glemt at bruge Strepsils Cool
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Strepsils Cool kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

- Overfølsomhedsreaktioner med udslæt, prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i mundhule eller svælg.
- Irritation i slimhinden kan udvikles ved længere tids brug.

Der kan være cariesrisiko ved længere tids brug.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Strepsils Cool utilgængeligt for børn.
Brug ikke Strepsils Cool efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Opbevar Strepsils Cool i den originale emballage.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Strepsils Cool, sugetabletter indeholder:
Aktive stoffer: Diklorbenzylalkohol og amylmetakresol.

Øvrige indholdsstoffer:
Flydende saccharose, flydende glucose, levomenthol, eucalyptusolie, xylitol, cool mint sensation smag, spearmint

Udseende
Strepsils Cool er en klar, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af sugetabletten.

Pakningsstørrelser
Strepsils Cool findes i blisterpakninger med 24 og 36 sugetabletter, og i rør med 10 stk sugetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
103-105 Bath Road
Slough
Berkshire
SL1 3UH

England

Repræsentant
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tel.: 4444 9701

Fremstiller
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Thane Road
Nottingham
NG90 2DB
England

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2011.